

250 g/l tebuconazol

emulsie de tip ulei în apă, de culoare gălbuie

- **Fungicid sistemic** pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, viță-de-vie, prun, măr și castraveți;
- Este absorbit prin frunze și rădăcini, rapid translocat în întreaga plantă;
- Substanța activă pătrunde în plantă și este distribuită acropetal, unde blochează dezvoltarea ciupercii, prin inhibarea ciclului sintezei ergosterolului, fiind foarte eficientă împotriva patogenilor.

CULTURA	SPECTRU COMBATERE
GRÂU	Boli foliare și ale spicului: (Făinarea - <i>Erysiphe graminis</i> , Septorioza - <i>Septoria tritici</i> , Rugina - <i>Puccinia</i> spp. Sfâșierea frunzelor - <i>Helminthosporium</i> spp., Fuzarioza - <i>Fusarium</i> spp.)
ORZ	Boli foliare (Făinarea - <i>Erysiphe graminis</i> , Pătarea reticulară - <i>Pyrenophora teres</i> , Arsura frunzelor - <i>Rhynchosporium secalis</i> , Sfâșierea frunzelor - <i>Helminthosporium sativum</i>)
RAPIȚĂ	Putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), Putregaiu negru (<i>Phoma lingam</i>), Alternarioza (<i>Alternaria brassicae</i>), Făinarea (<i>Erysiphe communis</i>)
VIȚĂ-DE-VIE	Făinarea (<i>Uncinula necator</i>)
PRUN	Monilioza (<i>Monilinia</i> spp.)
MĂR	Rapănul (<i>Venturia inaequalis</i>), Făinarea (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
CASTRAVEȚI	Făinarea (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)

DOZE ȘI MOD DE APLICARE

CULTURA	DOZE (L/HA)
GRÂU, ORZ	0,5 L/HA
RAPIȚĂ	1 L/HA
VIȚĂ-DE-VIE	0,4 L/HA
PRUN	0,075 - 0,1% (0,750 - 1,0 L/HA în 1000 L apă)
MĂR	0,05% (0,750 - 1,0 L/HA în 1500 L apă)
CASTRAVEȚI	0,5 L/HA

Grâu și orz - tratamentul se va face la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală. Intervalul de aplicare este cuprins între sfârșitul înfrățiului și sfârșitul înfloritului pentru grâu (se va evita tratamentul în perioada de înflorire) și sfârșitul înfrățiului și începutul înfloritului pentru orz.

Rapiță - tratamentul se poate aplica atât toamna, cât și primăvara. Toamna, pe lângă efectul de prevenire și de combatere a bolilor (ex. Phoma lingam), produsul ajută la creșterea rezistenței plantelor la iernare (în rădăcinare puternică, plante viguroase).

Tratamentele efectuate toamna sunt necesare în special în situația când semănatul timpuriu și condițiile climatice favorizează dezvoltarea excesivă a plantelor.

Tratamentul trebuie făcut în faza de 4-6 frunze formate!

Tratamentele din a doua parte a perioadei de vegetație se aplică la avertizare, până la debutul înfloritului și au ca scop combaterea putregaiurilor, alternariozei și a făinării.

Tratamentele se efectuează atât la rapița de toamnă, cât și la rapița de primăvară.

ALTE RECOMANDĂRI

Numărul maxim de tratamente pe an:

- Grâu, orz, prun, măr, castraveți - 2
- Vița-de-vie - 3

Intervalul între stropiri:

- Grâu și orz: 14 - 21 zile,
- Vița-de-vie: 12 - 14 zile
- Prun: 10 - 14 zile
- Măr: 7-12 zile

Timp de pauză:

- Grâu, orz, vița-de-vie: 35 zile
- Rapiță 30 zile
- Prun, castraveți: 7 zile/ Măr :14 zile