

PROXANIL®

PROXANIL® are o acțiune preventivă și curativă.

Cimoxanil cu acțiune de contact împotriva germinării sporilor și acțiune penetrantă cu o difuzie locală în plantă ce permite realizarea celei mai bune acțiuni curative de 1-2 zile față de toate substanțele utilizate în combaterea manei.

Propamocarb cu acțiune sistemică și translaminară, cu activitate antisporelă, absorbit și apoi redistribuit în plantă; acțiunea multi-site previne germinarea sporilor, reduce dezvoltarea miceliului, previne formarea purtătorilor de spori și limitează producerea de spori. Protejează și noile creșteri.

SUBSTANȚA ACTIVĂ propamocarb HCl 400 g/l + cimoxanil 50 g/l

FORMULARE suspensie concentrată (SC)

TIMP DE PAUZĂ PÂNĂ LA RECOLTARE 3 - 14 zile

CERTIFICAT OMOLOGARE NR. 423PC/ 05.06.2018

AMBALAJE 1 L, 5 L

CLASIFICARE ATENȚIE



CULTURI	SPECTRU DE COMBATERE	DOZA	TIMP DE PAUZĂ
 CARTOF (DE CONSUM, AMIDON ȘI SĂMÂNȚĂ)	Mana cartofului (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 l/ha	14 zile
 TOMATE (CÂMP ȘI SPAȚII PROTEJATE)	Mana tomatelor (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 l/ha	3 zile

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- **PROXANIL®** este flexibil în utilizare, astfel: primele două aplicări se fac pentru a preveni instalarea infecției, a avea un câmp curat și a evita infecțiile ulterioare, sau când este necesar un efect curativ, mai ales după ploii. Când mana apare în câmp are efect imediat de stopare
- Eficacitate foarte bună cu acțiune imediată și efect curativ, antisporulant și cu efect de lungă durată
- Are o foarte bună rezistență la spălare, după 2-6 ore de la aplicare (în funcție de umiditatea aerului)
- Profil toxicologic favorabil, de mediu și de reziduuri
- Excelent când plantele sunt în creștere activă, de la începutul până la sfârșitul perioadei de susceptibilitate a bolii
- Eficace asupra manei pe frunze și pe tulpini



