

## PLAN PENTRU EXTINDEREA VIETII DE RAFT LA CAPSUN



Mod de aplicare	La pregatirea terenului	Dupa rasarire	Intrarea in vegetatie si crestere	Inflorire	Fructificare
Radicular			<b>SymbioMyco Grow</b> – 500 g /1000 mp	<b>SymbioMyco Grow</b> – 500 g/ 1000 mp	<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml/1000 mp
			<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml / 1000 mp	<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml / 1000 mp	<b>SymbioMyco Grow</b> – 500 g/1000 mp
			<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml / 1000 mp	<b>SymbioMyco Grow</b> – 500 g / 1000 mp	<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml/1000 mp
				<b>SymbioSil 2C</b> – 250 ml/1000 mp	
				<b>Symbiothrive PRO AZ</b> – 2 L/1000 mp	
Foliar				<b>SymbioThrive PRO AZ</b> – 250 ml/100 litri apa	<b>SymbioThrive PRO AZ</b> – 250 ml/100 litri apa
					<b>SymbioThrive PRO AZ</b> – 250 ml/100 litri apa
					<b>SymbioSil PEEL</b> – 350 g/100 litri apa

## Cum este elaborata schema de tratament ?

- Schema prezentata este destinata cresterii vietii de raft a fructelor de capsun, bazata pe testul Symbiagro din Spania, Almeria, 2019 ;
- Tratamentele incep inca de la intrarea in vegetatie a capsunilor.
- **SymbioMyco Grow** – se recomanda aplicat radicular, de 4 ori pe sezon, pana in perioada fructificarii, in doza de 500 grame / 1000 metri patrati ;
- **SymbioSil 2C** – se recomanda aplicat radicular, de maxim 8 ori pe sezon, in doze mici, de 250 ml / 1000 metri patrati ;
- **SymbioThrive PRO AZ** – se va aplica radicular, in perioada de inflorire, in doza de 2 litri / 1000 metri patrati, cu dizvolarea flaconului cu bacterii benefice in flacon inainte. Se recomanda minim 1 aplicare pe sezon (ideal 2) ;
- **SymbioThrive PRO AZ** – se va aplica si foliar, 3 aplicari pe sezon, de la aparitia primelor flori si pe toata perioada fructificarii, la distante de 7 – 10 zile, amestecat cu tratamentele fitosanitare.
- **SymbioSil Peel** – se va aplica foliar, ori de cate ori se urmareste obtinerea unei culori mai intense, mai rapid.

### Mod de citire al tabelului

Tratamentele din tabel sunt impartite pe faze crestere in 2 moduri de aplicare. Ordinea tratamentelor incepe de la stanga la dreapta – de la coloana «Dupa rasarire » catre coloana « Inceperea taierii » . Nu se vor amesteca produse din celule diferite.

Mod de aplicare	Intrarea in vegetatie	Inflorire	Fructificare
Radicular	1	4	9
	2	5	10
	3	6	11
		7	
		8	
Foliar		1	2
			3
			4